

Primjene običnih diferencijalnih jednadžbi

Jurčić, Antonija

Undergraduate thesis / Završni rad

2020

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Department of Mathematics / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:126:091837>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-25**



Repository / Repozitorij:

[Repository of School of Applied Mathematics and Computer Science](#)



Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Sveučilišni preddiplomski studij matematike

Antonija Jurčić

Primjene običnih diferencijalnih jednadžbi

Završni rad

Osijek, 2020.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Sveučilišni preddiplomski studij matematike

Antonija Jurčić

Primjene običnih diferencijalnih jednačbi

Završni rad

Mentor: izv.prof. dr. sc. Tomislav Marošević

Osijek, 2020.

Sažetak

U ovom radu proučavat ćemo neke primjene običnih diferencijalnih jednačbi prvog reda u geometriji, fizici, biologiji te ekonomiji. Navest ćemo različite primjere problema koje ćemo modelirati pomoću diferencijalnih jednačbi. Za rješavanje takvih problema ključna su dva koraka. Prvi korak je postavljanje jednačbe koja opisuje vezu među veličinama koje se pojavljuju u tom problemu i zatim njihovo rješavanje pomoću metoda matematičke analize. Na samom početku definirat ćemo neke tipove običnih diferencijalnih jednačbi koje ćemo koristiti u primjerima prilikom rješavanja samih jednačbi.

Ključne riječi: diferencijalne jednačbe, rješenje, modeliranje

Abstract

In this paper, we will study some applications of ordinary first - order differential equations in geometry, physics, biology, and economics. We will aduce different examples of problems that we will model using differential equations. Two steps are crucial to solving such problems. The first step is to set up an equation that describes the relationship between the quantities that appear in that problem and then solve them using the method of mathematical analysis. At the very beginning, we will define some types of ordinary differential equations that we will use in the examples when solving the equations themselves.

Keywords: differential equations, solution, modeling

Sadržaj

Uvod	i
1 Osnovne definicije i neki tipovi običnih diferencijalnih jednađžbi	1
1.1 Diferencijalne jednađžbe sa separiranim varijablama	2
1.2 Homogene diferencijalne jednađžbe	2
2 Primjene diferencijalnih jednađžbi u geometriji	3
3 Primjene diferencijalnih jednađžbi u fizici i biologiji	5
4 Primjena diferencijalnih jednađžbi u ekonomiji	9
Literatura	10

Uvod

Diferencijalna jednačba je matematička jednačba koja povezuje neku funkciju y (tj. $x \rightarrow y(x)$) i neke njene derivacije. Diferencijalna jednačba je obična ako joj nepoznata funkcija ovisi samo o jednoj varijabli te opisuje vezu između te funkcije i njenih derivacija. Ove jednačbe su od velike važnosti u prirodnim i tehničkim znanostima. Prirodni zakon može se shvatiti kao nužna veza između sadašnjeg stanja jedne pojave i stanja neposredno nakon toga. Takav zakon prikazujemo diferencijalnom jednačbom, tj. veza fizikalnih veličina i njihovih promjena u prostoru i vremenu dana je diferencijalnom jednačbom. Većina diferencijalnih jednačbi znatno je složenija i teže se rješava.

Primjeri:

1. Diferencijalna jednačba $y''(x) + \sin y(x) = 0$ pojavljuje se kod proučavanja gibanja njihala.
2. $y''(t) + ay'(t) + by(t) = c \cos \omega t$ pojavljuje se kod proučavanja električkih krugova.
3. $y''(x) + xy(x) = 0$ pojavljuje se kod astronomskih istraživanja i na mnogim drugim mjestima.

Samo rješavanje diferencijalnih jednačbi zauzima pažnju znanstvenika od početka razvoja diferencijalnog računa do danas. Diferencijalne jednačbe prvog reda uspješno je rješavao švicarski matematičar Jacob Bernoulli (1655.-1705.). Jednu važnu i vrlo općenitu metodu za rješavanje diferencijalnih jednačbi uveo je francuski matematičar Joseph Lagrange (1736.-1813.).



Jacob Bernoulli (1655. - 1705.)

1 Osnovne definicije i neki tipovi običnih diferencijalnih jednađžbi

Diferencijalnom jednađžbom zovemo jednađžbu koja sadrži derivacije ili diferencijale nepoznate funkcije.

Ako nepoznata funkcija ovisi o jednom argumentu, diferencijalna jednađžba zove se obična, a ako ovisi od nekoliko argumenata pa sadrži parcijalne derivacije te nepoznate funkcije, tada se jednađžba zove parcijalna diferencijalna jednađžba. Red diferencijalne jednađžbe je red najviše derivacije koju diferencijalna jednađžba sadrži.

U ovom radu primjeri će sadržavati samo obične diferencijalne jednađžbe prvog reda koje imaju oblik:

$$F(x, y, y') = 0,$$

gdje je x argument, a y tražena funkcija.

Diferencijalna jednađžba se često svodi na oblik:

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0.$$

U tom slučaju možemo za nepoznatu funkciju uzeti y (kao funkciju od x), ali i x (kao funkciju od y).

Funkcija koja zadovoljava diferencijalnu jednađžbu zove se *rješenje ili integral diferencijalne jednađžbe*.

Rješenje ili integral diferencijalne jednađžbe zove se općim ako sadrži toliko neovisnih konstanti po volji koliki je red diferencijalne jednađžbe. Stoga slijedi da opće rješenje dif. jednađžbe n -tog reda uvijek sadrži n neovisnih konstanti $C_1, C_2, \dots, C_n$.

Geometrijski svakom partikularnom integralu diferencijalne jednađžbe odgovara njegova grafička predodžba, tj. graf u obliku ravninske krivulje koja se zove integralna krivulja te jednađžbe. Za određivanje jedne posebne krivulje familije koja odgovara uvjetima konkretnog zadatka potrebno je u opće rješenje uvrstiti početne uvjete, a ti uvjeti su točke $x = x_0, y = y_0$ (koordinate jedne točke za diferenc. jedn. prvog reda) kojom ta krivulja prolazi.

Rješenje diferencijalne jednađžbe koje se ne može dobiti iz općeg rješenja ni za kakvu vrijednost konstante C zove se *singularno rješenje*.

1.1 Diferencijalne jednačbe sa separiranim varijablama

Diferencijalne jednačbe sa separiranim varijablama su one kod kojih su varijable x i y separirane tj. daju se odvojiti. U tom slučaju zadana diferencijalna jednačba se svodi na sljedeći oblik:

$$f(x)dx = F(y)dy$$

Rješenje te jednačbe dobivamo tako da integriramo obje njene strane:

$$\int f(x)dx = \int F(y)dy + C$$

Pretpostavka za postojanje rješenja tih integrala jest neprekidnost funkcija f i F . Znamo da nam u tom slučaju Peanov teorem garantira lokalnu rješivost problema, dok nam jedinstvenost rješenja daje Lipschitzovost funkcije f i postojanje parcijalne derivacije druge varijable neprekidne u svakoj točki. Mogućnost integriranja obje strane jednačbe leži u tome što se varijable x i y mogu razdvojiti - separirati.

Rješavanje diferencijalnih jednačbi ovog tipa obično se svodi na nekoliko koraka:

1. derivaciju y' napišemo u obliku $\frac{dy}{dx}$
2. riješimo se nazivnika
3. diferencijalna jednačba se podijeli takvim izrazom da se varijable separiraju
4. diferencijalna jednačba se integrira zasebno po svakoj od separiranih varijabli.

1.2 Homogene diferencijalne jednačbe

Diferencijalna jednačba oblika $y' = f(x, y)$ zove se *homogena*, ako $f(x, y)$ možemo prikazati kao funkciju omjera varijabli x i y , tj. kao $\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, pa jednačba prima oblik:

$$y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right).$$

Iz toga slijedi da zbroj eksponenata od x i y u svakom članu homogene diferencijalne jednačbe oblika $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ mora biti isti.


Rješavajući homogenu diferencijalnu jednačbu svodimo ju na jednačbe sa separiranim varijablama i to pomoću supstitucije:

$$\begin{aligned} \frac{y}{x} = z &\Rightarrow y = xz \text{ i} \\ y' &= xz' + z \end{aligned}$$

2 Primjene diferencijalnih jednađbi u geometriji

Sama diferencijalna jednađba prvog reda ima svoje geometrijsko značenje. Iz diferencijalne jednađbe prvog reda $y' = f(x, y)$ neposredno slijedi da svakoj točki ravnine diferencijalna jednađba dodjeljuje tangens smjera $y' = \tan \alpha$ u toj točki, tj. određuje polje smjerova u ravnini.

Primjer 2.1. *Odredimo diferencijalnu jednađbu familije parabola $y = Cx^2$ te skup točaka u kojima sve parabole iz te familije imaju koeficijent smjera tangente jednak 1.*



Slika uz primjer 2.1

Eliminacijom parametra C iz

$$y = Cx^2 \quad \text{i} \quad y' = 2xC$$

dobiva se diferencijalna jednađba zadane familije parabola:

$$2y - xy' = 0.$$

Preostaje odrediti skup točaka u kojima sve parabole iz te familije imaju koeficijent smjera tangente jednak 1. Iz sustava:

$$y = Cx^2 \quad \text{i} \quad 1 = 2xC$$

zaključujemo da je to pravac $y = \frac{x}{2}$. Dakle, za svaki C parabola $y = Cx^2$ u točki presjeka s pravcem $y = \frac{x}{2}$ ima koeficijent smjera tangente jednak 1.


Primjer 2.2. *Odredimo sve krivulje sa svojstvom da je u bilo kojoj točki tih krivulja radijus vektor r jednak duljini odsječka normale između krivulje i osi x .*

Radijus vektor krivulje u nekoj točki $T(x,y)$ je

$$r = |OT| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

dok je duljina odsječka normale od točke T do sjecišta s x -osi

$$N = y\sqrt{1 + y'^2}.$$



Slika uz primjer 2.2

Kako je prema uvjetu zadatka $r=N$, slijedi

$$\sqrt{x^2 + y^2} = y\sqrt{1 + y'^2}.$$

Kvadriranjem izraza dobivamo

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= y^2(1 + y'^2) \\ x^2 + y^2 &= y^2 + y^2 y'^2 \\ y^2 y'^2 &= x^2 \end{aligned}$$

$$y'^2 = \frac{x^2}{y^2}$$

$$y' = \pm \frac{x}{y} .$$

Dobili smo običnu diferencijalnu jednadžbu sa separiranim varijablama. Sada promatramo dva slučaja: $y' = \frac{x}{y}$ i $y' = -\frac{x}{y}$.

1. slučaj: Ako je $y' = \frac{x}{y}$, tada imamo:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y},$$

$$y dx = x dy,$$

$$\int x dx = \int y dy,$$

$$\frac{x^2}{2} = \frac{y^2}{2} + C,$$

$$x^2 - y^2 = C .$$

Kao rješenje smo dobili familiju jednakokraničnih hiperbola.

2. slučaj: Ako je $y' = -\frac{x}{y}$, tada imamo:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y},$$

$$y dy = -x dx,$$

$$\int x dx = - \int y dy$$

$$\frac{x^2}{2} = -\frac{y^2}{2} + C$$

$$x^2 + y^2 = C .$$

U ovom drugom slučaju kao rješenje dobivamo familiju kružnica sa središtem u ishodištu.

3 Primjene diferencijalnih jednadžbi u fizici i biologiji

Diferencijalne jednadžbe omogućuju matematički zapis zakona koji određuju fizikalne fenomene u prirodi kao što su npr. za Newtonov zakon hlađenja, Drugi Newtonov zakon za opis gibanja u polju sile, raspad atoma, zagrijavanje i hlađenje tijela, istjecanje fluida i sl. Navest ćemo neke primjere kroz koje ćemo vidjeti široku primjenu ovih jednadžbi u fizikalnim zakonima.

Primjer 3.1. *Točka mase m giba se pravocrtno pod djelovanjem sile F koja je proporcionalna vremenu t i obrnuto proporcionalna brzini gibanja v . Odredimo ovisnost između brzine v i vremena t ako je točka započela gibanje iz stanja mirovanja.*

Prema drugom Newtonovu zakonu je:

$$F = m \frac{dv}{dt}$$

gdje je $\frac{dv}{dt}$ akceleracija gibanja, pa prema uvjetu zadatka imamo

$$m \frac{dv}{dt} = k \frac{t}{v} \Big| v dt .$$

Traženo rješenje dobivamo rješavanjem ove diferencijalne jednadžbe sa separiranim varijablama

$$\begin{aligned} m v dv &= k t dt, \\ m \int v dv &= k \int t dt, \\ m \frac{v^2}{2} &= k \frac{t^2}{2} + C. \end{aligned}$$

Opće rješenje danog problema je:

$$m \frac{v^2}{2} = k \frac{t^2}{2} + C$$

Uvrštavanjem početnih uvjeta $v = 0$ i $t = 0$ dobivamo $C=0$, pa je

$$v = \sqrt{\frac{k}{m}} t.$$

Primjer 3.2. *Okrugla pločica rotira u tekućini. Djelovanje trenja na pločicu usporava rotaciju i to proporcionalno kutnoj brzini ω okretaja. Izrazimo kutnu brzinu kao funkciju vremena ovisnu o t ako je poznato da se za 25 sekundi od početka gibanja kutna brzina smanjila od 100 na 50 okretaja u sekundi.*

Označimo li s $\omega(t)$ kutnu brzinu u trenutku t (odnosno broj okretaja pločice u sekundi u trenutku t), tada će $\frac{d\omega}{dt}$ biti promjena kutne brzine u trenutku t . Prema uvjetu zadatka dobivamo:

$$\frac{d\omega}{dt} = -k\omega$$

gdje je k koeficijent proporcionalnosti, dok je predznak minus pokazatelj da je funkcija $\omega(t)$ padajuća, pa je $\frac{d\omega}{dt} < 0$. Dobili smo diferencijalnu jednadžbu sa separiranim varijablama koju rješavamo na sljedeći način:

$$\begin{aligned} \int \frac{d\omega}{\omega} &= -k \int dt, \\ \ln|\omega| &= -kt + \ln|C|, \\ \ln\left|\frac{\omega}{C}\right| &= -kt, \\ \omega &= C e^{-kt}. \end{aligned}$$

Uvrštavanjem $\omega = 100$ i $t=0$ dobivamo $C = 100$, pa je

$$\omega = 100e^{-kt}. \quad (1)$$

Koeficijent proporcionalnosti k ćemo odrediti iz drugog uvjeta $\omega = 50$ i $t = 25$:

$$\begin{aligned} 50 &= 100e^{-25k}, \\ 1 &= 2e^{-25k}, \end{aligned}$$

pa slijedi da je

$$k = \frac{\ln 2}{25} = 0.04 \ln 2.$$

Uvrštavanjem u (1) dobivamo:

$$\omega(t) = 100e^{(-0.04 \ln 2)t}$$

i to je tražena kutna brzina izražena kao funkcija ovisna o t .

Primjer 3.3. *Newtonov zakon hlađenja glasi: "Promjena temperature objekta u nekom trenutku proporcionalna je razlici temperature objekta u tom trenutku i temperature okoline." Koristeći ovaj zakon riješite sljedeći problem: U hotelskoj sobi temperatura 20°C policija je u ponoć otkrila tijelo žrtve. Temperatura tijela bila je 26°C , a 2h kasnije 24°C . Kada se otprilike dogodio zločin?*

Označimo: $T(t)$ -temperatura objekta u trenutku t

T_{OK} -temperatura okoline .

$$\frac{dT}{dt} = k(T_{\text{objekta}} - T_{OK}) \quad \text{Newtonov zakon u matematičkom zapisu}$$

$T_{OK} = 20^\circ\text{C}$, k -konstanta proporcionalnosti

$$T(0) = 26^\circ\text{C}$$

$$T(2) = 24^\circ\text{C}$$

Zanima nas trenutak t kada je $T(t)=36.5^\circ\text{C}$.

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20)/dt / : (T - 20) \neq 0$$

$$\int \frac{dT}{T - 20} = k \int dt,$$

$$\ln|T - 20| = kt + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$T - 20 = ce^{kt}, \quad c \neq 0$$

$$\underline{T(t) = 20 + ce^{kt}, \quad c \in \mathbb{R}}$$

$$T(0) = 26^\circ\text{C}$$

$$26 = 20 + c \Rightarrow c=6$$

$$T(2) = 24^\circ\text{C}$$

$$24 = 20 + 6e^{2k}$$

$$2 = 3e^{2k}/\ln$$

$$k = -0.2027 .$$

Uvrštavanjem k u $T(t)$ dobivamo:

$$T(t) = 20 + 6e^{-0.2027t}$$

$$36.5 = 20 + 6e^{-0.2027t}$$

$$t = -4.98$$

$$t \approx 19 : 00 \text{ h. (Stoga, zločin se dogodio oko 19:00 sati.)}$$

• Modeli rasta populacije (primjena u biologiji)

Malthusov model populacije glasi: "Brzina rasta populacije u trenutku t proporcionalna je broju jedinki u tom trenutku."

Jednadžba modela glasi:

$$\frac{dP}{dt} = kP,$$

gdje je

t -vrijeme,

$P(t)$ -broj jedinki u trenutku t ,

k -koeficijent proporcionalnosti.

Riješimo gornju diferencijalnu jednadžbu:

$$\int \frac{dP}{P} = k \int dt,$$

$$\ln|P| = kt + C, \Rightarrow P = Ce^{kt} .$$

C je konstanta koju možemo odrediti ako znamo početnu populaciju $P(0) = P_0$. Tada iz $P(0) = Ce^0 = C$, pa je rješenje modela populacije dano formulom:

$$P(t) = P_0 e^{kt}.$$

Primjer 3.4. Stanovništvo gradića raste proporcionalno postojećem broju stanovnika. Ako se nakon 2 godine broj stanovnika udvostručio, a nakon 3 godine broji 20 000 stanovnika, izračunaj početni broj stanovnika.

Označimo sa $N(t)$ broj stanovnika u vremenu t i početni broj stanovnika sa N_0 . Naša diferencijalna jednadžba ima oblik:

$$\frac{dN}{dt} - kN = 0, \text{ koja ima rješenje: } N(t) = ce^{kt} .$$

Za početne uvjete: $t=0$, $N(0) = N_0 \Rightarrow N_0 = ce^{k0} \Rightarrow c = N_0$ pa je $N(t) = N_0 e^{kt}$.

Nakon 2 godine populacija se udvostručuje: $t = 2$, $N(2) = 2N_0 \Rightarrow 2N_0 = N_0 e^{2k}$

$$\ln 2 = 2k \ln e \Rightarrow k = \frac{1}{2} \ln 2 = 0.3465 \Rightarrow k \approx 0.3465 .$$

Dakle, naša diferencijalna jednačba ima oblik:

$$N(t) = N_0 e^{0.3465t}.$$

Broj stanovnika nakon 3 godine iznosi 20 000, tj. za $t = 3$ imamo $N(3) = 20000$.

Stoga, dobivamo $20000 = N_0 e^{3 \cdot 0.3465}$ odnosno: $20000 = N_0 e^{1.0397} = 2.8284 N_0 \Rightarrow N_0 = 7071$.

Gradić je na početku promatranja imao $N_0 = 7071$ stanovnika.

4 Primjena diferencijalnih jednačbi u ekonomiji

Mnogi ekonomski problemi mogu se formulirati kao ekonomsko-matematički model i zatim rješavati adekvatnim matematičkim metodama. Jedan od mogućih pristupa jest onaj koji se primjenjuje u okviru matematičke ekonomije. Pritom se rješavaju odgovarajuće diferencijalne jednačbe.

Primjer 4.1. *Štediša je oročio 5000kn uz kamatnu stopu koja se računa kontinuirano, sa 8.5% u prvih 4 godine i 9.25% za naredne 3 godine. Izračunaj koliko će biti na računu, nakon 7 godina.*

U početku je bilo 5000kn $\Rightarrow N(0) = 5000$ i za prve 4 godine $k=0.085$.

Naša diferencijalna jednačba ima oblik: $\frac{dN}{dt} - 0.085N = 0$, čije je rješenje:

$$N(t) = ce^{kt} = ce^{0.085t} (0 \leq t \leq 4).$$

Za početne uvjete: $t = 0 \Rightarrow 5000 = ce^{0 \cdot 0.085} = c \Rightarrow c = 5000$, $N(t) = 5000e^{0.085t}$.

Nakon 4 godine na računu je za $t=4$, $N(4) = 5000e^{4 \cdot 0.085} = 7024.74kn$.

Vrijednost 7024.74kn je početni uvjet za drugi dio zadatka:

U početku je bilo 7024.74kn $\Rightarrow N(0) = 7024.74$ i za naredne 3 godine je $k = 0.0925$.

Naša diferencijalna jednačba ima oblik:

$$\frac{dN}{dt} - 0.0925N = 0$$

koja ima rješenje:

$N(t) = ce^{kt} = ce^{0.0925t} (0 \leq t \leq 3) \Rightarrow$ Stoga, dobivamo: za $t=0$,

$7024.74 = ce^{0 \cdot 0.0925} = c \Rightarrow c = 7024.74$, pa je $N(t) = 7024.74e^{0.0925t}$, za $t \in [0, 3]$.

Nakon naredne 3 godine na računu je: $N(3) = 7024.74e^{0.0925 \cdot 3} = 9271.44kn$.

Stoga, nakon 7 godina na računu će biti 9271.44kn.

Literatura

- [1] M. Alić , *Obične diferencijalne jednačbe* , Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2001.
- [2] B. Apsen, *Riješeni zadaci više matematike uz drugi dio repetitorija*, Tehnička knjiga, Zagreb, 1966.
- [3] I. Crnjac, *Obične diferencijalne jednačbe* , vježbe na Odjelu za matematiku, Osijek 2019.
- [4] S. Majstorović, *Populacijska i logistička jednačba-Primjene diferencijalnog i integralnog računa II* , predavanja na Odjelu za matematiku, Osijek 2019.
- [5] M. Vijuga, *Riješeni zadaci iz više matematike* , www.moje-instrukcije.com, 23.8.2020.